

「あなたのかかりつけ医として」

勝浦病院だより

お問い合わせ


☎0885(42)2555

IP050(3438)7441



これからの季節マムシにご注意!!

咬まれたら応急処置を行いながらすぐに病院を受診してください。血清は勝浦病院に常備しています。



マムシは沖縄を除く日本全国に分布する毒蛇です。マムシ咬傷は年間3000例以上の報告があり、死亡率は0.1～1.0%程度とされています。死因は急性腎不全がもっとも多く、DIC、心筋変性、多臓器不全などの報告もあります。

マムシの特徴

- 体長45～60cmで、他の蛇に比べて太短く、尾が細いのが特徴
- 黒褐色の銭形模様が交互に並び、頭が三角形に近い
- 上顎骨先端近くに一对の毒牙があり、先端近くの側孔から毒液が出る

病院到着前の応急処置

- 急いで走ると血液の循環が活発になり、毒素の吸収を早め、重症化しやすい。
- 慌てず全身の安静を保つ。
- 咬傷部を流水でよく洗う。
- 毒の吸引器があればそれを使用。
- 咬傷部位より中枢側を軽く縛る。
- 局所を氷などで冷やさない(虚血を招き局所が壊死になる)。
- 咬傷部を口で吸引する場合、口腔内に傷があれば危険。

病院での治療

- 毒素を排除するため局所を切開して吸引
- 合併症(急性腎不全など)予防のため輸液
- 重傷度に応じてマムシ抗毒素血清を投与
- 二次感染防止のため抗生剤や破傷風トキソイド、テタノブリンを投与



マムシ抗毒素血清には重大な副作用がみられます。即時型反応としてアナフィラキシーショックが5%、血清病が10～20%と比較的高率に起こるとされています。副作用のほとんどないセファランチンが主に使われていますが、受傷後6時間以内にGrade IIIを越える重症者にはマムシ抗毒素血清を使用しています。咬まれたら応急処置を行いながらすぐに病院を受診してください。血清は勝浦病院に常備しています。

8月の糖尿病教室は次のとおりです。

日	担当	内容
2日(火)	内科医師	糖尿病について
9日(火)	栄養士	食事について
16日(火)	薬剤師	薬について
23日(火)	看護師	生活と運動について

- 場所 勝浦病院 2階 多目的室
- 時間 午後1時30分～1時間程度
- 費用 無料です。
- その他 お申し込みは不要で自由参加です。

特定健診について

勝浦病院でも特定健診の受付をおこなっています。

※今年から内科医師によるエコー検査も追加検査として選択できるようになりました。

特定健診の受入には限りがありますので、お早めにご予約ください。

8月の予定は、8日(月)と19日(金)です。

