

営農情報(令和6年8月)

作成・監修 勝浦町農業振興推進班

■温州みかん

◇かん水

降雨が少なく土壌の乾燥が続くようであればかん水する。かん水の開始は、旧葉の黄化または日中の葉の巻き始めを目安にする。

◇台風対策

台風被害としては、強風による樹の倒伏、枝折れ、果実の損傷等があり、病害発生を伴う品質低下があります。台風の進路予想を確認しながら、樹の状態に応じた事前の対策を行う。

■すだち

◇摘果・摘葉と果実の緑色保持

摘果の仕上げと摘葉は、収穫20日前までに行い、緑色の濃い果実に仕上げましょう。緑色保持対策は次のとおり。

- ①収穫予定7～30日前にジベレリン液剤500倍(1回)を果実に散布する。
- ②8月初旬に硫酸(8kg/10a)の施用する。

■うめ

◇夏季剪定

樹冠内部の日当たりをよくするため、8月下旬から9月上旬に、冬季剪定の70%を剪定する。

【病害虫防除】

温州みかん

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
8月 下旬	ミカンハダニ ミカンサビダニ 黒点病	ダニゲッター(フ)または メビウス(フ)加用	2,000	前日	1回
		ジマンダイセン(水)または ペンコゼブ(水)	3,000	7日	2回以内
			600	30日	4回 //
			600	30日	4回 //
	チャノキイロアザミウマ	アドマイヤー(フ)	3,000	14日	3回 //

※ダニゲッター(フ)、メビウス(フ)はアザミウマ類にも有効

すだち

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
収穫前	貯蔵病害	ベフラン(液)25 または ベンレート(水)	2,000	前日	2回以内
			4,000	//	2回 //

ゆず

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
8月 中下旬	黒点病	ストロビー(ド) または オキシンドー(水)80	2,000	14日	3回以内
			800	30日	3回 //
	ミカンハダニ	コロマイト(水) または ダニゲッター(フ)	2,000	7日	2回 //
			2,000	前日	1回

※2剤ともオキシンドーとの混用を避けること。

かき

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
8月 月上旬	カキノヘタムシガ	パダンSG(水溶)	1,500	45日	4回以内
	炭疽病	ジマンダイセン(水)または キノドー(水)80	600	45日	2回 //
			1,000	14日	5回 //
	うどんこ病 (多発園)	ストロビー(ド)または スコア(顆)	3,000	14日	3回 //
		3,000	前日	3回 //	
発生時	カメムシ類	スタークル(顆)	2,000	前日	3回 //

■水稻

◇水管理

出穂前後は水分が必要なので水を切らさないようにします。収穫前まで間断かん水で管理しますが、落水は刈取作業に差し支えない限り遅らせます。(そのために、しっかりした中干しをしておく必要があります。)

◇カメムシ類

出穂すると周辺雑草に潜むカメムシが、稲穂をめがけやってきます。周辺雑草の草刈は、出穂2週間前には終えてください。出穂直前の草刈は田んぼに追い込むので逆効果です。

◇いもち病

出穂後、穂いもちに注意が必要です。低温、日照不足、肥料過多で発生が助長されます。

◇紋枯れ病

高温により発生が助長されます。下葉から発生し、次第に上の葉まで広がります。

「あきさかり」は、発生しやすいので注意してください。

■夏秋なす

◇追肥

NK化成 20kg/10a程度を7～10日間隔で施します。着果量が多くなれば追肥の間隔を短くします。苦土欠乏が出ないように硫酸マグネシウム10kg/10aを適宜施用します。

◇病害虫防除

高温乾燥が続くとハダニ、アザミウマ等の発生が多くなるので、発生初期のうちから定期的に防除します。また、8月中下旬からハスモンヨトウ、オオタバコガ等の発生が増加するので、注意深く観察してください。

■オクラ

◇追肥

・肥切れさせないように、S604またはNK化成808を畦肩や通路に10～20kg/10aを、10日間隔で施用する。

◇かん水

・乾燥が続くと、肥料が効きにくくなるので、追肥にあわせて適宜かん水する。

【病害虫防除】

	対象病害虫	薬剤名	散布量	収穫前日数	使用回数
水稻	いもち病	コラトップ(粒)	3～4kg/10a	(穂いもち) 出穂30日前～5日前	2回以内
	紋枯病	リンバー(粒)	3～4kg/10a	収穫30日前	2回 //
	カメムシ類 ウンカ類	キラップ(粒)または トレボン(乳)	3kg/10a 1000～2000倍	収穫14日前 収穫14日前	2回 // 3回 //
夏秋 なす	うどんこ病	トリフミン(水)	3,000倍	収穫前日	5回以内
	ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ	コテツ(フ)	2,000倍	収穫前日	4回 //
	ハスモンヨトウ オオタバコガ	プレオ(フ)	1,000倍	収穫前日	4回 //
オクラ	うどんこ病	トリフミン(水)	5,000倍	収穫前日	3回以内
	オオタバコガ	プレオ(フ)	1,000倍	収穫前日	2回 //
	ハスモンヨトウ	プレバソン(フ)5	2,000倍	収穫前日	3回 //

【お知らせ】

■町単事業の申請締切日について

小規模苗木購入補助事業(補助金 500円/本)については、申請締切日が9月30日(月)となっております。役場農業振興課で申請を受付ますので、お早めに申請願います。

<お問い合わせ先>

勝浦町農業振興推進班

勝浦町農業振興課42-1505 JA農業振興戦略実践課088-538-7180 徳島農業支援センター088-626-8768