

営農情報(令和8年8月)

作成・監修 勝浦町農業振興推進班

■温州みかん

◇かん水

降雨が少なく土壌の乾燥が続くようであればかん水する。かん水の開始は、旧葉の黄化または日中の葉の巻き始めを目安にする。

◇台風対策

台風被害としては、強風による樹の倒伏、枝折れ、果実の損傷等があり、病害発生を伴う品質低下があります。台風の進路予想を確認しながら、樹の状態に応じた事前の対策を行う。

■すだち

◇摘果・摘葉と果実の緑色保持

摘果の仕上げと摘葉は、収穫20日前までに行い、緑色の濃い果実に仕上げましょう。緑色保持対策は次のとおり。

- ①収穫予定7～30日前にジベレリン液剤500倍(1回)を果実に散布する。
- ②8月初旬に硫安(8kg/10a)を施用する。

■うめ

◇夏季剪定

樹冠内部の日当たりをよくするため、8月下旬から9月上旬に、冬季剪定の70%を剪定する。

【病害虫防除】

温州みかん

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
8月 下旬	ミカンハダニ ミカンサビダニ 黒点病	ダニゲッター(フ)または メビウス(フ)加用	2,000	前日	1回
		ジマンダイセン(水)または ペンコゼブ(水)	3,000	7日	2回以内
			600	30日	4回 //
			600	30日	4回 //
	チャノキイロアザミウマ	アドマイヤー(フ)	3,000	14日	3回 //

※ダニゲッター(フ)、メビウス(フ)はアザミウマ類にも有効

すだち

収穫前	貯蔵病害	ベルコート(フ)加用	2,000	前日	2回以内
		トップジンM(水)または ベンレート(水)	2,000	//	5回 //
			4,000	//	2回 //

ゆず

8月 中下旬	黒点病	ストロビー(ド) または プレオ(フ)または	2,000	14日	3回以内
			800	30日	3回 //
	ミカンハダニ	コロマイト(水) または ダニゲッター(フ)	2,000	7日	2回 //
			2,000	前日	1回

※2剤ともオキシンドーとの混用を避けること。

かき

8月上旬	カキノヘタムシガ	アグロスリン(水)または パダンSG(水溶)	1,000 1,500	前日 45日	3回以内 4回 //
	炭疽病	キノンドー(水)80 または ジマンダイセン(水)	1,000 600	14日 45日	5回 // 2回 //
	うどんこ病(多発園)	スコア(顆水)	3,000	3日	3回 //
発生時	カメムシ類	スタークル(顆)	2,000	前日	3回 //

■水稻

◇水管理

出穂前後は水分が必要なので水を切らさないようにします。
収穫前まで間断かん水で管理しますが、落水は刈取作業に差し支えない限り遅らせます。
(そのために、しっかりした中干しをしておくことが必要です。)

◇カメムシ類

出穂すると周辺雑草に潜むカメムシが、稲穂をめがけやってきます。周辺雑草の草刈は、出穂2週間前には終えてください。出穂直前の草刈は田んぼに追い込むので逆効果です。

◇いもち病

出穂後、穂いもちに注意が必要です。低温、日照不足、肥料過多で発生が助長されます。

◇紋枯れ病

高温により発生が助長されます。下葉から発生し、次第に上の葉まで広がります。

「あきさかり」は、発生しやすいので注意してください。

■夏秋なす

◇追肥

NK化成 20kg/10a程度を7～10日間隔で施します。着果量が多くなれば追肥の間隔を短くします。苦土欠乏が出ないよう硫酸マグネシウム20kg/10aを適宜施用します。

◇病虫害防除

高温乾燥が続くとハダニ、アザミウマ等の発生が多くなるので、発生初期のうちから定期的に防除します。また、8月中下旬からハスモンヨトウ、オオタバコガ等の発生が増加するので、注意深く観察してください。

■オクラ

◇追肥

・肥切れさせないように、S604またはNK化成808を畦肩や通路に10～20kg/10aを、10日間隔で施用する。

◇かん水

・乾燥が続くと、肥料が効きにくくなるので、追肥にあわせて適宜かん水する。

【病虫害防除】

	対象病虫害	薬剤名	散布量	収穫前日数	使用回数
水稻	いもち病	コラトップ(粒)	3～4kg/10a	(穂いもち) 出穂30日前～5日前	2回以内
	紋枯病	リンバー(粒)	3～4kg/10a	収穫30日前	2回 //
	カメムシ類 ウンカ類	キラップ(粒)または トレボン(乳)	3kg/10a 1000～2000倍	収穫14日前 収穫14日前	2回 // 3回 //
夏秋 なす	うどんこ病	トリフミン(水)	3,000倍	収穫前日	5回以内
	ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ	コテツ(フ)	2,000倍	収穫前日	4回 //
	ハスモンヨトウ オオタバコガ	プレオ(フ)	1,000倍	収穫前日	4回 //
オクラ	うどんこ病	トリフミン(水)	5,000倍	収穫前日	3回以内
	オオタバコガ	プレオ(フ)または	1,000倍	収穫前日	2回 //
	ハスモンヨトウ	プレバソン(フ)5	2,000倍	収穫前日	3回 //

【令和8年度農業振興対策事業 害虫捕獲事業のお知らせ】

町内の園地で捕獲したゴマダラカミキリを、頭部のみを乾燥させた状態で10匹をひとまとめにして持参してください。 ※端数についても買い上げます。

◇受付日および時間 令和8年8月17日(月) 午後1時から午後3時まで

◇受付場所 レヴィタかつうら(勝浦町地域活性化センター)

◇支払額 ゴマダラカミキリの捕獲費として、1匹あたり50円を支払います。

<お問い合わせ先>

勝浦町農業振興推進班

勝浦町農業振興課42-1505 JA農業振興戦略実践課088-538-7180 徳島農業支援センター088-626-8768