


# 令和8年産 勝浦みかん 作況情報(R8.5.20)

監修・作成 勝浦町農業振興推進班



注1) 降水量は、徳島県水防情報データ(横瀬)

注2) 気温は、徳島気象台データ

注3) 平年気温値は、徳島気象台 (1991~2020の30年間の平均値)

## 2 開花および着花状況 (5/12 町内8園地調査)

- ・ 晩生みかんの満開日は早い地域で5/5、遅い地域で5/10であり、地域の中心日は平年より1週間程度早まっている。
- ・ 着花量は、前年よりやや多い。
- ・ 新梢の発生状況は樹勢によりばらつきがあるものの、良好である。

※ 開花調査時には、果樹カメムシ類の発生が多く、ハマキムシの発生も多い。

## 3 病害虫の発生状況 (5.19付 病害虫発生予察情報)

- ・ ヤノネカイガラムシ

発生時期は平年並み (初発生: 5月13日)

5月23日~5月28日が防除適期となる。

薬剤はモベント (フ) 2,000倍またはアプロード (水) 1,000倍。

- 黒点病      平年よりやや多く (前年より多い) で発生程度は「少」
  - そうか病    平年よりやや多く (前年より多い) で発生程度は「少」
- 薬剤はデラン (フ) 1,000倍またはナティーボ (フ) 1,500倍。

黒点病とそうか病いずれにも効果あり。

- ・ ミカンハダニ

平年より少なく (前年並み)、発生程度は「少」

- ・ 果樹カメムシ類

平年より多く (前年より多い)、発生程度は「多」